

GREEN
ECO
POLAND

GREEN HAS ITALIA
Progresso in Agricoltura

GREEN ECO POLAND

Firma **GREEN ECO POLAND** powstała w 2014 roku, przy współudziale kapitałowym włoskiej spółki **GREEN HAS ITALIA**, stając się wyłącznym dystrybutorem produktów tej firmy, która od 30 lat zajmuje się produkcją nawozów do odżywiania i stymulowania roślin.

Lata doświadczeń oraz rozbudowany dział B+R, pozwalają stworzyć innowacyjne produkty i opracować nowoczesne rozwiązania, które pomagają rolnikom zwiększać plony oraz podnosić ich jakość.

GREEN HAS ITALIA zdobyła już zaufanie klientów na całym świecie, posiada swoje oddziały w wielu krajach m.in. w Hiszpanii, Brazylii i w Jordanii. Od stycznia 2014 roku jest również w Polsce!

W ofercie firmy **GREEN ECO POLAND** można znaleźć dużą gamę produktów dedykowanych dla ogrodnictwa i rolnictwa zawierających makro i mikroelementy oraz podnoszących żyzność i urodzajność gleby, a także produkty stymulujące wzrost i rozwój roślin.



DOŁĄCZ DO NAS I POWIĘKSZ SWOJE PLONY

STOP & GO



PROJEKT STOP & GO - TO PROPOZYCJA PRZYPORZĄDKOWANIA PRODUKTÓW DO TRZECH GRUP, KTÓRE MOŻNA PRZEDSTAWIĆ Z PUNKTU WIDZENIA ROŚLIN W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH FENOLOGICZNYCH.

GO

Produkty typu „GO" – zielone – stymulują wzrost roślin, wzbogacają glebę i wpływają na zwiększenie plonu. Stosowane są w fazach fenologicznych, które cechują się wzrostem, rozwojem części nadziemnych roślin lub owoców.

NEUTRAL

Produkty typu „NEUTRAL" – białe – wspomagają, uzupełniają oraz poprawiają efektywność produktów typu GO lub STOP. Wpływają pozytywnie na jakość przeprowadzanych zabiegów oraz na zdrowotność roślin. Stosowane mogą być we wszystkich fazach fenologicznych.

STOP

Produkty typu „STOP" – czerwone – wpływają na wielkość i jakość plonu. Stosowane są w fazach fenologicznych, w których rośliny intensyfikują ukorzenianie, kwitnienie i zawiązywanie owoców. Pozytywnie wpływają na wybarwianie owoców oraz wyrównanie wegetacji roślin.



STYMULACJA WZROSTU

WSPOMAGANIE UZUPEŁNIANIE

TWORZENIE INTENSYFIKACJA

GREEN ECO POLAND

FAZY FENOLOGICZNE ROŚLINY



PREMIUM

Linia produktów **PREMIUM** obejmuje wysoce zaawansowane technologicznie nawozy, charakteryzujące się niezwykle wysoką skutecznością działania.

Wpływają na przyspieszenie procesów metabolicznych roślin co przekłada się na poprawę parametrów jakościowych plonu. Produkty premium działają na rośliny antystresowo i pomagają roślinom przezwyciężyć stres abiotyczny i biotyczny.

EXPANDO

SPECJALNA FORMUŁA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH I ORGANICZNYCH ORAZ HORMONÓW I WITAMIN

GO



DUŻE, WYRÓWNANE, IDEALNIE WYBARWIONE OWOCE

WYSOKI UDZIAŁ PLONU HANDLOWEGO

PRODUKT KOMPLETNY POD WZGLĘDEM SKŁADU

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
OWOCE ZIARNKOWE	3 - 4 l/ha	Pierwszy zabieg, w dawce 4l/ha, wykonać kiedy zawiązki mają 15-20mm lub 7 dni po przerzedzaniu chemicznym zawiązków. Kolejne 2 zabiegi wykonać po 7-10 dniach (3 l/ha).
OWOCE PESTKOWE	3 - 4 l/ha	Pierwszy zabieg, w dawce 4l/ha, wykonać po 2 tygodniach od początku opadania płatków. Kolejne 2 zabiegi wykonać po 7-10 dniach (3 l/ha).
JAGODOWE	3 - 4 l/ha 450 - 700 ml/100 l wody	Pierwszy zabieg wykonać od pojawienia się pierwszych zawiązków owoców (4 l/ha). Kolejne 2 - 3 zabiegi co 7-10 dni (3 l/ha).
POMIDOR, PAPRYKA OGÓREK	400 - 600 ml/100 l wody	Po wytworzeniu zawiązków 1 grona, kolejne 3 zabiegi wykonywać o 10 -14 dni.
UWAGA: NIE STOSOWAĆ EXPANDO ŁĄCZNIE Z NAWOZAMI DOLISTNYMI ZAWIERAJĄCYMI NPK ORAZ PRODUKTAMI ZAWIERAJĄCYMI WAPŃ.		

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (**N**) całkowity ..... **3**% w/w (3,8% w/v)
Azot (N) organiczny ..... 3% w/w (3,8% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) całkowity ..... **4**% w/w (5,1% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie przez kwas ortofosforowy..... 4% w/w (5,1% w/v)
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie ..... **6**% w/w (7,6% w/v)
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,02**% w/w (0,025% w/v)
Mangan (**Mn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie ..... **0,02**% w/w (0,025% w/v)
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,13% w/v)
Węgiel (**C**) organiczny pochodzenia biologicznego ..... **12**% w/w (15,2% w/v)
Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

MECHANIZM DZIAŁANIA

EXPANDO stymuluje komórki do intensywnych podziałów. Powoduje większy rozrost pojedynczej komórki. Ma to bezpośrednie przełożenie na wielkość produkowanych owoców. **EXPANDO** wpływa na zwiększenie plonu handlowego, poprawiając kalibraż owoców, ich wybarwienie, smakowitość i zdolność do przechowywania.



Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND

DOŚWIADCZENIA W JABŁONIACH

Wyniki doświadczeń stosowania EXPANDO w jabłoniach odmiany GALA 12 lat - Tarczyn, IPSAD 2016r.





DOŚWIADCZENIA W CZEREŚNIACH



Wyniki doświadczeń stosowania EXPANDO w czereśniach odmiana KORDIA 10 lat - Tarczyn, IPSAD 2016r.

DOŚWIADCZENIA W BORÓWCE AMERYKAŃSKIEJ BLUECROP

Wyniki doświadczeń stosowania EXPANDO w borówce amerykańskiej odmiana BLUECROP - SGGW Warszawa 2017r.





REVIVAL

GO



WAPŃ SKOMPLEKSOWANA AMINOKWASAMI

ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY WAPNIA	POSIADA 15% WOLNYCH AMINOKWASÓW I WAPŃ	ODSTRESOWUJE ROŚLINĘ

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistne	
DRZEWA OWOCOWE	2 - 3 l/ha	Stosować zapobiegawczo od końca kwitnienia, zabieg powtórzyć 2-4 razy w odstępach co 15 dni.
JAGODOWE	1,5 - 2 l/ha	Stosować zapobiegawczo przed kwitnieniem, następnie 2-3 razy w odstępach co 15 dni.
WARZYWA POLOWE	1,5 - 2 l/ha	Stosować zapobiegawczo 14 dni po wysadzeniu lub pełnych wschodach roślin. Zabieg powtórzyć 2-3 razy w odstępach co 15 dni.
ROLNICZE	1,5 - 2 l/ha	Stosować zapobiegawczo po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin (4-6 liść), zabieg powtórzyć 1-2 razy w odstępach co 15 dni.
MAKSYMALNE DAWKI STOSOWAĆ INTERWENCYJNIE PRZED I PO WYSTĄPIENIU STRESU.		

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (**N**) organiczny ..... **4,5**% w/w (5,54% w/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie ..... 4,5% w/w (5,54% w/v)
Węgiel (**C**) organiczny ..... **15**% w/w (18,9% w/v)
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie ..... **5**% w/w (6,3% w/v)
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,126% w/v)

Aminokwasy wolne ..... **15**% w/w (18,9% w/v)

PRODUKT ZAWIERA INNOWACYJNĄ FORMUŁĘ AMINOKWASÓW I WAPNIA, KTÓRA POZWALA NA SZYBKIE I SKUTECZNE DOSTARCZENIE WAPNIA JUŻ W CZASIE KWITNIENIA, JAK RÓWNIEŻ W TRAKCIE WEGETACJI.
SZCZEGÓLNIE POLECANY PODCZAS WYSOKICH TEMPERATUR .

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND



ALGAREN BZn

ALGI MORSKIE + CYNK I BOR

POPRAWIA KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

ZMNIEJSZA NEGATYWNE SKUTKI PRZYMROZKÓW

SKUTECZNIE UZUPEŁNIA BOR I CYNK

DAWKOWANIE

UPRAWY	DOLISTNIE DAWKI	TERMINY
DRZEWA OWOCOWE	300-500 ml/100 l wody lub 1,5-2,5 l/ha*	W fazie białego/różowego pąka, podczas kwitnienia, bezpośrednio po opadnięciu płatków kwiatowych oraz przed i po wystąpieniu przymrozków.
JAGODOWE	300-500 ml/100 l wody lub 1,5-2,5 l/ha**	Po 2 tygodniach od rozpoczęcia wegetacji, tuż przed kwitnieniem oraz dwa zabiegi po kwitnieniu w odstępach 7-10 dni.
WARZYWA POD OSŁONAMI	300-400 ml/100 l wody (5 - 10 l roztworu/100 m^2 w zależności od wielkości roślin)	Po przesadzeniu do gruntu, przed kwitnieniem lub zawiązywaniem główek.
WARZYWA W POLU	250-400 ml/ 100 l wody**	Po przesadzeniu do gruntu, przed kwitnieniem lub zawiązywaniem główek.
ROLNICZE	W każdym zabiegu stosować na 1 ha 1,2-2,0 l nawozu w 200-400 l wody	Wykonać 3 zabiegi: 1. Jesienią faza 3-6 liści. 2. Wiosną po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin. 3. Przed kwitnieniem (rzepak).
ROŚLINY OZDOBNE	150-200 ml/100 l wody 0,75 - 1,0 l/ha**	W czasie wegetacji roślin co 30 dni. Początek kwitnienia.
MOCZENIE: zanurzyć nasiona/bulwy/korzenie sadzonek w 0,2 - 0,4 % roztworze wodnym przed wysianiem/wysadzeniem do gruntu.		
W przypadku wystąpienia przymrozków stosować maksymalną dawkę. W przypadku wrażliwych upraw lub odmian nie stosować w okresie kwitnienia.		

* objętość używanej wody dla sadów 500-750 l na ha

** objętość używanej wody dla plantacji warzywniczych, jagodowych i ozdobnych 400-600 l na ha

SKŁAD:

Azot całkowity (**N**) ..... **2,0**% (m/m)
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **1,72**% (m/m)
Cynk (**Zn**) rozpuszczalny w wodzie ..... **2,58**% (m/m)
Węgiel organiczny (**C**) ..... **5,8**% (m/m)

PRODUKT ZAWIERA EKSTRAKTY Z WODOROSTÓW – ECKLONIA MAXIMA ORAZ BOR I CYNK. STOSOWANY PRZED KWITNIENIEM POPRAWIA KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW. ZAWARTY W PRODUKCIE CYNK AKTYWUJE WIELE ENZYMÓW I ZMNIEJSZA NEGATYWNE SKUTKI WIOSENNYCH PRZYMROZKÓW.



ALGAREN TWIN



WYCIĄG Z ALG MORSKICH ECKLONIA MAXIMA

STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO	NIEZASTĄPIONY W PRODUKCJI ROZSADY	ODPOWIEDNI STOSUNEK AUKSYN DO CYTOKININ

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	
JAGODOWE	300-400 ml/100 l wody 1,5 – 2 l/ha	Po wysadzeniu rozsady, wiosną po ruszeniu wegetacji.
WARZYWA POD OSŁONAMI	300-400 ml/100 l wody	Po przesadzeniu do gruntu. Kolejny zabieg wykonać po około 14 dniach.
WARZYWA W POLU	250-400 ml/100 l wody	Od 4 liścia właściwego, zabieg powtórzyć po 14 dniach.
ROLNICZE	400-600 ml/100 l wody	Jesienią faza 3-6 liści. Wiosną po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin.
ROŚLINY OZDOBNE	150-200 ml/100 l wody	Pierwszy zabieg wykonać po wysadzeniu lub wschodach roślin, kolejny zabieg wykonać po około 14 dniach. Wiosną: zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji.
FERTYGACJA: rozpuścić produkt do koncentracji 0,05-0,2%.		
MOCZENIE: zanurzyć nasiona/bulwy/korzenie sadzonek w 0,2-0,3% roztworze wodnym przed wysianiem/ wysadzeniem do gruntu.		
PRODUKCJA ROZSADY: wykonać 3 zabiegi w kolejnych dawkach 100/200/400 ml/100 l wody, od momentu pojawienia się liści właściwych, w odstępie co 7 dni.		

BIO
DOZWOLONE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Węgiel organiczny (C) ..... 14% w/w (16,1% w/v)
Azot organiczny (N) ..... 2% w/w (2,3% w/v)
pH: 5,5 ± 0,5
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa 50%

pH (w 1% roztworze wodnym) 5,5 ± 0,5 u. pH

PRODUKT POWODUJE ZWIĘKSZENIE MASY KORZENI WŁOŚNIKOWYCH, DZIĘKI CZEMU ROŚLINY SĄ LEPIEJ WYKARMIONE I ZDROWSZE.
NIEZASTĄPIONY PRZY PRODUKCJI ROZSADY, DOSKONAŁY PARTNER DLA MINERALNYCH NAWOZÓW FOSFOROWYCH.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND

MECHANIZM DZIAŁANIA

Dzięki unikalnej recepturze o odżywczym działaniu połączonym z kompozycją zawierającą maksymalne stężenie ilościowe auksyn względem cytokinin pochodzących z wyciągu **alg morskich *Ecklonia maxima***, produkt gwarantuje ciągły rozwój nowego i zdrowego systemu korzeniowego, a w konsekwencji lepszą i większą absorpcję elementów odżywczych.



Działanie Algaren Twin w punktach akumulacji korzeni.

Intensywna aktywność podziału komórkowego, powodującego zarówno wydłużenie korzenia, jak również rozrost nowych korzeni.

SYSTEM KORZENIOWY PO ZASTOSOWANIU ALGAREN TWIN W UPRAWIE SELERA

MINERAŁY
PREMIUM

Linia produktów **MINERALNYCH PREMIUM** obejmuje nawozy płynne o bardzo wysokiej przyswajalności i skuteczności działania.

Są to specjalne kompozycje składników, które jednocześnie odżywiają i wspomagają rośliny w tych fazach fenologicznych, które decydują o wielkości i jakości plonu. Pozwalają roślinom lepiej wykorzystać ich naturalny potencjał produkcyjny, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, wpływając przez to na opłacalność danej uprawy. Produkty **MINERALNE PREMIUM** mają za zadanie dostarczenie właściwych składników odżywczych, nie zaburzając równowagi roślin pod względem biochemicznym.

KRIPTHER



WYSOKA ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU W FORMIE FOSFORYNU POTASU

ODŻYWIA I WZMACNIA ROŚLINĘ	POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ FUNGICYDÓW	UAKTYWNIA NATURALNE PROCESY ODPORNOŚCI ROŚLIN

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE		TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	Fertygacja	
DRZEWA OWOCOWE	250 - 350 ml/100 l wody 2-2,5 l/ha	10 - 12 l/ha	Przed kwitnieniem – 1 zabieg. Po kwitnieniu co 15-20 dni – wykonać 2 zabiegi.
	W przypadku łącznego stosowania z fungicydami stosować w dawce 1 l/ha.		
JAGODOWE	150 - 250 ml/100 l wody 1,5-2 l/ha	1 - 2 l /1000 m^2	Od ruszenia wegetacji co 30 dni do rozpoczęcia wybarwiania pierwszych owoców. Jesienią po zbiorach wykonać zabieg w podwójnej dawce.
WARZYWA POLOWE	250 - 350 ml/100 l wody 2-2,5 l/ha	-	Ok. 20 dni po wysadzeniu roślin lub po pełnych wschodach w fazie 3-6 liścia, powtarzać co 30 dni.
ROŚLINY OZDOBNE I SZKÓŁKI	200 - 300 ml/100 l wody 1-1,5 l/ha	1 - 1,5l /1000 m^2	Po przesadzeniu, po ruszeniu wegetacji co 30 dni.
ZIEMNIAKI	1 - 2 l/ha	-	30 dni po pełnych wschodach roślin, powtórzyć 1-2 razy w okresie wegetacji nie częściej jak co 30 dni.
BURAK CUKROWY	1 - 1,5 l/ha	-	Od fazy 6 liścia właściwego do zwarcia międzyrzędzi, powtarzać 2-3 razy co 14 dni.
RZEPAK	1,5 - 2,5 l/ha	-	Jesienią w fazie 4-6 liścia właściwego. Wiosną po ruszeniu wegetacji, kolejny zabieg powtórzyć za 30 dni.
KUKURYDZA	1,5 - 2 l/ha	-	Zastosować w fazie 6-8 liścia właściwego.
ZBOŻA OZIME	1 - 1,5 l/ha	-	Jesienią w fazie 4-6 liścia. Wiosną po ruszeniu wegetacji, powtórzyć za 30 dni.
PRODUKCJA ROZSADY	250 - 500 ml/ 100 l wody	Podlewanie roztworem o stężeniu 0,05%	2-3 zabiegi w cyklu produkcyjnym wykonać dolistnie lub poprzez podlewanie. Stosować od momentu wytworzenia liści właściwych.

W PRZYPADKU ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z FUNGICYDAMI STOSOWAĆ W DAWCE 1 L/HA.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie ..... **34**% w/w (49,3% w/v)
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie ..... **16**% w/w (23,2% w/v)
Tlenek magnezu (**MgO**) rozpuszczalny w wodzie ..... **2% w/w** (2,9% w/v)
Miedź (**Cu**) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie ..... **0,05**% w/w (0,073% w/v)
Zakres pH, który gwarantuje stabilność roztworu waha się w przedziale 4 - 7,3.
pH (w 1% roztworze wodnym) 4,5 ± 0,5 u. pH

PRODUKT O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI FOSFORYNU POTASU. POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA FUNGICYDÓW. INDUKUJE NATURALNĄ ODPORNOŚĆ ROŚLIN. STYMULUJE WZROST KORZENI WŁOŚNIKOWYCH.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND



MAGIC P STAR

WYSOKA ZAWARTOŚĆ FOSFORU, MAGNEZU I MIKROELEMENTÓW

EFEKTYWNIE DOSTARCZA FOSFOR W NISKICH TEMPERATURACH	POPRAWIA UKORZENIANIE ROŚLIN	ZAWIERA AKTYWNY FOSFOR

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	
DRZEWA OWOCOWE	1,5 - 3 l/ha	Na początku wegetacji i przed kwitnieniem. Na początku dojrzewania owoców.
JAGODOWE	1,5 - 2 l/ha	W nowych plantacjach 14 dni po wysadzeniu roślin do gruntu. Po ruszeniu wegetacji i przed kwitnieniem.
WARZYWA POD OSŁONAMI	350 - 500 ml/ 100 l wody	W przypadku problemów z przyswajaniem fosforu. 14 dni po wschodach lub po przesadzeniu roślin. Powtórzyć przed kwitnieniem lub zawiązywaniem główek.
WARZYWA POLOWE	1,5 - 2 l/ha	
ROLNICZE	1,5 - 2 l/ha	Po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin oraz w przypadku problemów związanych z niedoborem fosforu.
ROŚLINY OZDOBNE	100 - 150 ml/ 100 l wody 1-1,5 l/ha	Po przesadzeniu i przed kwitnieniem.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (**N**) całkowity ..... **3**% w/w (4,2% w/v)
Azot (N) amidowy ..... 3% w/w (4,2% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie ..... **27**%w/w (37,8% w/v)
Tlenek magnezu (**MgO**) rozpuszczalny w wodzie ..... **6**% w/w (8,4 % w/v)
Żelazo (**Fe**) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie ..... **0,05**% w/w (0,07% w/v)
Cynk (**Zn**) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie ..... **0,10**% w/w (0,14 w/v)
Zakres pH, który gwarantuje stabilność roztworu waha się w przedziale 4-7,3.

pH (w 1% roztworze wodnym) 3,0 ± 0,5 u. pH

UNIKALNE POŁĄCZENIE FOSFORU I MAGNEZU Z DODATKIEM ŻELAZA I CYNKU. WYSOKA ZAWARTOŚĆ AKTYWNEGO FOSFORU, DOSKONALE PRZYSWAJALNEGO W NISKICH TEMPERATURACH - POLECANY SZCZEGÓLNIE DO PIERWSZYCH ZABIEGÓW.



CALFOMYTH



UNIKALNE POŁĄCZENIE WAPNIA I FOSFORU

POPRAWIA KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW	UJEDNOLICA I INTENSYFIKUJE WYBARWIANIE	WPŁYWA NA POLEPSZENIE JAKOŚCI PLONU

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	
DRZEWA ZIARNKOWE	300 – 400 ml/ 100 l wody	W fazie różowego pąka - 1 zabieg. Od początku wybarwiania owoców – 2 zabiegi, co 10 - 14 dni.
DRZEWA PESTKOWE	250 – 350 ml/ 100 l wody	W fazie zielonego/białego pąka. Początek dojrzewania 2 zabiegi, co 10-14 dni.
JAGODOWE	250 – 350 ml/ 100 l wody	Przed kwitnieniem i następnie 2-3 zabiegi, co 10 dni.
WARZYWA	250 – 300 ml/ 100 l wody	Pierwszy zabieg przed kwitnieniem, kolejne 2 zabiegi od wzrostu zawiązków co 10-14 dni.
ROŚLINY OZDOBNE	100 – 200 ml/ 100 l wody	Po przesadzeniu do gruntu i przed kwitnieniem.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (**N**) całkowity ..... **3**% w/w (4,20% w/v)
Azot (N) azotanowy..... 1,7% w/w (2,38% w/v)
Azot (N) amidowy ..... 1,3% w/w (1,82% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie ..... **23**% w/w (32,20% w/v)
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie ..... **5**% w/w (7,00% w/v)
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,14% w/v)
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,14% w/v)

pH (w 1% roztworze wodnym) 3,0 ± 0,5 u. pH

UNIKALNE POŁĄCZENIE FOSFORU I WAPNIA, Z DODATKIEM BORU I MOLIBDENU. POLECANY PRZED KWITNIENIEM W CELU DOSTARCZENIA ENERGII I LEPSZEGO ZAWIĄZANIA OWOCÓW. STOSOWANY PRZED ZBIOREM DOSTARCZA WAPŃ I POPRAWIA WYBARWIENIE OWOCÓW.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND



HASCON M10 Alta Densità

WYSOKA ZAWARTOŚĆ FOSFORU, POTASU I MIKROELEMENTÓW

WSPOMAGA WYBARWIANIE	POPRAWIA SMAK PODNOSI POZIOM CUKRÓW (BRIX)	PRZYSPIESZA DREWNIENIE

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
DRZEWA ZIARNKOWE	4 - 5 l/ha	Wykonać 3 zabiegi co 10-14 dni. Pierwszy zabieg wykonać 6 tygodni przed zbiorem. Uwaga: W przypadku problemów z wybarwieniem owoców, zastosować jednorazowo 12-15 litr/ha w 800 – 1000 Litr wody /ha w terminie ok. 3 tygodnie przed zbiorem owoców.
DRZEWA PESTKOWE	2 - 3 l/ha	Na początku dojrzewania owoców – 2-3 zabiegi co 7 - 10 dni. Po zbiorach.
JAGODOWE	1,5 - 2,5 l/ha	Na początku dojrzewania pierwszych owoców, kolejne 2 zabiegi co 7 – 14 dni. Po zbiorze owoców, a przed przebarwianiem liści.
WARZYWA POD OSŁONAMI POMIDOR, PAPRYKA, OGÓREK	300 - 450 ml/ 100 l wody	Na początku dojrzewania owoców, kolejne 2-3 zabiegi co 7-14 dni.
WARZYWA POLOWE POMIDOR, PAPRYKA, OGÓREK	3 - 4 l/ha	Na początku dojrzewania pierwszych owoców, kolejne 2 zabiegi co 7-14 dni.
ROŚLINY OZDOBNE	150 - 250 ml/ 100 l wody 1 - 1,5 l/ha	Przez cały cykl uprawy.
SZKÓŁKI	500 ml/100 l wody	Na zdrewnienie pędów.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Tlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie ..... **15**% w/w (21% w/v)
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie ..... **20**% w/w (28% w/v)
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,14% w/v)
Mangan (**Mn**) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie ..... **0,1**% w/w (0,14% w/v)
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,01**% w/w (0,014% w/v)
Zakres pH, który gwarantuje stabilność roztworu waha się w przedziale 4 - 7,3.

DOSKONAŁA PROPORCJA POMIĘDZY FOSFOREM I POTASEM Z DODATKIEM BORU, MANGANU I MOLIBDENU. POPRAWIA WYBARWIANIE OWOCÓW I JAKOŚĆ PLONU. PRZYSPIESZA PROCES DREWNIENIA PĘDÓW. POLECANY RÓWNIEŻ W SZKÓŁKACH DRZEW.





NAWOZY ORGANICZNE

Linia **NAWOZÓW ORGANICZNYCH** obejmuje nawozy oparte na aminokwasach, kwasach humusowych i fulwowych. Usprawniają czynności metaboliczne, zwiększając produktywność uprawianych rośli. Wpływają na jakość użytkową cieczy roboczej i lepszą przyswajalność mikro i makroelementów. Poprawiają właściwości fizyczne i biologiczne gleby.

GREENHUM

GO



PŁYNNA FORMUŁA KWASÓW HUMUSOWYCH I FULWOWYCH

DOSKONAŁY ZWIĄZEK CHELATUJĄCY

WSPOMAGA ROZWÓJ WŁOŚNIKOWEGO SYSTEMU KORZENIOWEGO

WPŁYWA NA ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE		TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	Fertygacja	
DRZEWA OWOCOWE	1,5 - 2 l/ha	15 - 20 l/ha	Po ruszeniu wegetacji; przed kwitnieniem; podczas wzrostu owoców.
JAGODOWE			
WARZYWA POLOWE I POD OSŁONAMI	2 - 3 l/ha	-	Po przesadzeniu; podczas wzrostu wegetatywnego roślin.
ROLNICZE	1 - 2 l/ha	-	Po ruszeniu wegetacji. Po pełnych wschodach roślin wykonać 2-3 zabiegi, co 15-20 dni w okresie wzrostu wegetatywnego roślin.
ROŚLINY OZDOBNE I SZKÓŁKI	100 - 120 ml/ 100 l wody	1 - 1,5 l/1000 m^2	Wzrost wegetatywny zabiegi co 10-15 dni.
FERTYGACJA: rozprowadzać produkt o stężeniu 0,2-0,3%. Zabiegi wykonywać 1-2 razy w okresie wegetacji roślin.			

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Substancja organiczna t.j.j. ..... **15**% w/w (16,5% w/v)
Substancja organiczna s.s. ..... **71,7**% w/w
Stosunek shumusowanej substancji organicznej do suchej substancji organicznej **61,8**%
Azot (N) organiczny s.s. ..... **1,5**% w/w
Stosunek C/N 27,7
Środek wyciągający ..... KOH

GOTOWA DO UŻYCIA, PŁYNNA FORMUŁA KWASÓW HUMUSOWYCH Z DODATKIEM KWASÓW FULWOWYCH. POPRAWIA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY. POLECANY NA GLEBY LEKKIE I ZMĘCZONE, O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY ORAZ NA GLEBY BARDZO ZWIĘZŁE.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND

GO



GREENHUM WP

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW HUMUSOWYCH I FULWOWYCH Z LEONARDYTU

UŻYŹNIA GLEBĘ	WSPOMAGA ROZWÓJ WŁOŚNIKOWEGO SYSTEMU KORZENIOWEGO	POPRAWIA STOSUNKI POWIETRZNO-WODNE GLEBY

DAWKOWANIE

UPRAWY	Opryskiwanie gleby	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
DRZEWA OWOCOWE	4-6 kg/ha	Produkt stosować jako oprysk na glebę przed siewem lub sadzeniem roślin. Zalecany oprysk grubokroplisty – duża ilość wody. Niższą dawkę produktu stosować po ruszeniu wegetacji roślin.
WARZYWA POLOWE I POD OSŁONAMI	3-6 kg/ha	
ROLNICZE	3-5 kg/ha	
JAGODOWE	3-5 kg/ha	
SZKÓŁKI	5 kg/ha	

WPŁYW KWASÓW HUMUSOWYCH NA STRUKTURĘ GLEBY
I ROZMIESZCZENIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE

Gleba uboga w kwasy humusowe



Gleba zasobna w kwasy humusowe

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Węgiel (**C**) organiczny rozpuszczalny w wodzie ..... 40% w/w
Węgiel (C) organiczny zhumifikowany ..... 38,5% w/w
Azot (**N**) organiczny ..... 0,9% w/w

Kwasy humusowe ..... 80% w/w

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW HUMUSOWYCH Z LEONARDYTU. POPRAWIA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY. POLECANY NA GLEBY LEKKIE I ZMĘCZONE, O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY. POPRAWIA STRUKTURĘ GLEBY I WYMIANĘ KATIONOWĄ

1 kg 5 kg

VIT-ORG

GO



AMINOKWASY I POLISACHARYDY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

ORGANICZNY ADIUWANT	POPRAWIA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY	STANOWI DOSKONAŁĄ POŻYWKĘ DLA MIKROORGANIZMÓW

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE		TERMINY STOSOWANIA I ZALECENIA	
	Dolistnie	Doglebowo	Dolistnie	Doglebowo
DRZEWA OWOCOWE	2,5 – 5 l/ha	5 - 10 l/ha	W trakcie wegetacji, po kwitnieniu 2-3 zabiegi co 15 dni.	Przed siewem, sadzeniem roślin lub przy problemach z glebą. Po ruszeniu wegetacji lub wysadzeniu roślin do gleby stosować dwukrotnie w max. dawce. W przypadku łącznego stosowania z nawozami mineralnymi stosować dolną dawkę.
JAGODOWE	2 – 3 l/ha	5 - 10 l/ha	Po ruszeniu wegetacji 2-3 zabiegi.	
WARZYWA POD OSŁONAMI	2,5 – 3,5 l/ha	5 - 10 l/ha	Po wysadzeniu roślin 2-3 zabiegi co 15 dni.	
WARZYWA POLOWE	2 – 3 l/ha	5 - 10 l/ha	Po wysadzeniu roślin wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni.	
ROLNICZE	1,5 – 2,5 l/ha	5 – 10 l/ha	Po pełnych wschodach roślin lub ruszenia wegetacji wykonać 2-3 zabiegi co 14 dni.	
ROŚLINY OZDOBNE	1,25 – 2 l/ha	1-2 l/1000 m^2	Po wysadzeniu lub przed kwitnieniem co 15 dni.	
FERTYGACJA: maksymalne stężenie roztworu 0,3%. W uprawach pod osłonami stosować po dezynfekcji gleby w dawce 2 l/ 1000 m^2. OPRYSK GLEBY: zabieg wykonać w trakcie opadów lub na mokrą glebę z dużą ilością wody.				

VIT-ORG zaleca się stosować łącznie z nawozami dolistnymi lub agrochemikaliami (np. chlorek wapnia) w celu polepszenia ich skuteczności działania w dawce: 1 l/ha. Nie przekraczać 4% stężenia chlorku wapnia.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (N) organiczny ..... 3% w/w (3,9% w/v)
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie ..... 6% w/w (7,8% w/v)
Węgiel (C) organiczny ..... 14% w/w (18,2% w/v)

PRODUKT ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY ROŚLINNE, DOSKONAŁY PARTNER DO CHLORKU WAPNIA. STOSOWANY DOGLEBOWO WPŁYWA KORZYSTNIE NA POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Z GLEBY. ZWIĘKSZA ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ I WZBOGACA JEJ MIKROFLORĘ.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND



GREIT VG

100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
PROMOTOR WZROSTU POCHODZENIA ROŚLINNEGO

AMINOKWASY ROŚLINNE	NA STRESY TERMICZNE	DO STOSOWANIA PODCZAS KWITNIENIA

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
DRZEWA OWOCOWE	2 – 3 l/ha	Przed kwitnieniem. Podczas kwitnienia, przed i po wystąpieniu przymrozków. W czasie wzrostu zawiązków.
JAGODOWE	1,5 – 2,5 l/ha	
WARZYWA POLOWE	1,5 - 2 l/ha	Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin. Kolejne zabiegi co 15-20 dni.
WARZYWA POD OSŁONAMI	250 - 350 ml / 100 l wody	Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin. Podczas wzrostu wegetatywnego.
ROLNICZE	1,5 – 2 l/ha	Wiosną po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin. Podczas wzrostu wegetatywnego.
ROŚLINY OZDOBNE	250 - 400 ml / 100 l wody	W trakcie wzrostu wegetatywnego roślin co 15-20 dni.
FERTYGACJA: rozprowadzać produkt o koncentracji 0,2%-0,3%.		
W OKRESIE KWITNIENIA PRZED I PO WYSTĄPIENIU STRESU GREIT VG STOSOWAĆ OSOBNO W GÓRNEJ ZALECANEJ DAWCE!		
GREIT VG w dawce 1 l/ha można stosować podczas całego okresu wegetacji roślin, aby zwiększyć skuteczność działania środków ochrony roślin, chlorku wapnia i nawozów dolistnych.		

BIO
DOZWOLONE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (**N**) całkowity..... 5% w/w (6,25% w/v)
Azot (N) organiczny..... 5% w/w (6,25% w/v)
Węgiel (**C**) organiczny..... 16% w/w (20% w/v)

Całkowita ilość aminokwasów ..... 20% w/w (25% w/v)
Aminokwasy wolne..... 12% w/w (15% w/v)

INNOWACYJNY NAWÓZ ORGANICZNY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI WOLNYCH AMINOKWASÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. WYKAZUJE SILNE DZIAŁANIE ANTYSTRESOWE, SKUTECZNY PO PRZYMROZKACH I W CZASIE UPAŁÓW. OGRANICZA FITOTOKSYCZNOŚĆ CHLORKU WAPNIA. PRODUKT ZALECANY DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ W CZASIE KWITNIENIA I W OKRESIE PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH.



NUTRIGREEN AD

AMINOKWASY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO POWSTAŁE W PROCESIE HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ

POSIADA WYSOKĄ ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW BUDUJĄCYCH BIAŁKA

STYMULUJE WZORST WEGETATYWNY ROŚLIN

ZAWIERA 19 KLUCZOWYCH AMINOKWASÓW

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	
DRZEWA OWOCOWE	2 - 3 l/ha	Od ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia 1-2 zabiegi. Kolejne 2-3 zabiegi wykonać od fazy orzecha włoskiego (po opadzie czerwcowym) co ok. 20 dni. Stopniowo zmniejszać dawkę do 1 l/ha w ostatnim zabiegu.
JAGODOWE	1,5 - 2,5 l/ha	Od ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia 1-2 zabiegi. Kolejne 2-3 zabiegi od momentu tworzenia zawiązków co 7- 14 dni.
ROLNICZE	1,5 - 2 l/ha	Od początku wegetacji lub 6 liścia, 2-3 zabiegi co 7-14 dni.
WARZYWA POD OSŁONAMI	250 - 400 ml/100 l wody	Podczas wzrostu wegetatywnego roślin 2-3 zabiegi co 30 dni.
WARZYWA POLOWE	2 - 2,5 l/ha	
MAKSYMALNE DAWKI STOSOWAĆ INTERWENCYJNIE PRZED I PO WYSTĄPIENIU STRESU.		
W celu polepszenia skuteczności działania nawozów dolistnych i agrochemikaliów można stosować NUTRIGREEN AD w dawce 0,5 - 1 l/ha.		

BIO
DOZWOLONE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/w przy 20°C)

Azot (**N**) organiczny ..... **8**% w/w (10% w/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie ..... 8% w/w (10% w/v)
Węgiel (**C**) organiczny ..... **23,5**% w/w (29,3% w/v)
Całkowita ilość aminokwasów ..... **50**% w/w (62,5% w/v)

ZAWIERA 19 KLUCZOWYCH AMINOKWASÓW. SZYBKO I SKUTECZNIE DOSTARCZA AZOT W FORMIE ORGANICZNEJ. STYMULUJE INTENSYWNY WZROST ROŚLIN. POLECANY DO ZASTOSOWANIA PO RUSZENIU WEGETACJI, PRZED KWITNIENIEM I W CZASIE WZROSTU ROŚLIN.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND

NUTRIGREEN AD zastosowany na roślinach powoduje:

- szybką regenerację rośliny po przebytym stresie
- oszczędność energetyczną roślin w procesie syntezy białek
- stymulację wzrostu wegetatywnego roślin i wzrost plonów
- zwiększenie odporności roślin na stres
- zwiększenie wchłaniania stosowanych agrochemikaliów

FUNKCJA NUTRIGREEN AD JAKO ADIUWANTA:

LIŚĆ POKRYTY WODĄ

LIŚĆ PO ZASTOSOWANIU NAWOZU

NUTRIGREEN AD
zaleca się stosować łącznie z nawozami dolistnymi lub agrochemikaliami
w celu polepszenia ich skuteczności działania w dawce 0,5-1 l/ha.

AMINOGRAM



ILOŚĆ AMINOKWASÓW LEWOSKRĘTNYCH - 323,78 g/l

MAKRO I MIKROELEMENTY

Linia produktów **MAKRO i MIKROELEMENTY** obejmuje nawozy płynne i rozpuszczalne w wodzie na bazie makro i mikroelementów w formie chelatowanej lub skompleksowanej. Charakterystyczną cechą preparatów tej linii jest szybka i wysoka przyswajalność składników pokarmowych, dzięki czemu doskonale wpisują się w programy zapobiegania niedoborom, jak również nadają się do zabiegów interwencyjnych w przypadku wystąpienia ich objawów. Szybkie tempo przyswajania powoduje niemal natychmiastową reakcję ze strony roślin. Niedostateczne zaopatrzenie w makro i mikroskładniki może powodować drastyczny spadek plonu i pogorszenie jego jakości.

CARRIER Zn



WYSOKA ZAWARTOŚĆ CYNKU 135 g/l
100% CYNKU SKOMPLEKSOWANEGO LSA

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY CYNKU	CYNK WZBOGACONY O TECHNOLOGIĘ LSA	POPRAWIA ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
DRZEWA OWOCOWE	0,8 - 2 l/ha	Po ruszeniu wegetacji. Przed kwitnieniem, przed spodziewanymi przymrozkami. Po zbiorze owoców.
JAGODOWE	0,8 - 1,5 l/ha	Pękanie pąków i po zbiorach owoców.
WARZYWA POD OSŁONAMI	150 ml - 200 ml/ 100 l wody	Od 4-go liścia prawdziwego. Podczas wzrostu wegetatywnego.
WARZYWA POLOWE	0,8 - 1,2 l/ha	
ROLNICZE (zboża, kukurydza, ziemniaki)	0,8 - 1,5 l/ha	Od 4-tego liścia właściwego lub od fazy krzewienia. W momencie stwierdzonego niedoboru.
ROŚLINY OZDOBNE	100 - 150 ml/ 100 l wody	Od 4-tego liścia.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Cynk (**Zn**) rozpuszczalny w wodzie..... **10**% w/w (13,5% w/v)
Cynk (Zn) całkowity skompleksowany ..... 10% w/w (13,5% w/v)

CYNK - SKOMPLEKSOWANY LSA - W WYSOCE EFEKTYWNEJ FORMIE, KTÓRA PRZEKŁADA SIĘ NA SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA. ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ FOTOSYNTEZY I POPRAWIA ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN. POBUDZA DO WZROSTU SYSTEM KORZENIOWY ROŚLIN.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND



BOROGREEN L

WYSOKOSKONCENTROWANY BOR (150 g/l)
100% W POSTACI BOROETANOLOAMINY

POPRAWIA ZAPYLANIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW	JEST NOŚNIKIEM CUKRÓW W ROŚLINIE	ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY BORU

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	
DRZEWA OWOCOWE	0,8 – 1,5 l/ha	* Przed kwitnieniem (1-2 zabiegi). * Po wytworzeniu zawiązków. * Przy niedoborach. * Po zbiorze owoców (2 zabiegi na zielone, sprawne liście).
JAGODOWE	0,5 – 1 l/ha	Pierwszy zabieg w fazie białego pąka, drugi po 10-14 dniach. Po zbiorach przed przebarwieniem liści.
WARZYWA POLOWE	0,8 - 1,5 l/ha	1-3 zabiegi od fazy 4-6 liścia co 10-14 dni.
RZEPAK	0,6 - 1,0 l/ha	Jesienią po wytworzeniu 4-8 liści. Wiosną po ruszeniu wegetacji, 10-14 dni później oraz po wytworzeniu pąków kwiatowych.
BURAKI CUKROWE	0,6 - 1,0 l/ha	W fazie 4-8 liści, kolejny zabieg przed zwarciem międzyrzędzi.
ZIEMNIAKI	0,6 - 1,0 l/ha	Przed zwarciem międzyrzędzi i w fazie rozbudowy bulw.
KUKURYDZA	0,6 - 1,5 l/ha	Faza 3-5 liść, drugi zabieg w fazie 6-8 liścia.
ROŚLINY MOTYLKOWE	0,6 - 1,0 l/ha	W fazie 6-8 liści i przed kwitnieniem.
ROŚLINY OZDOBNE	100 - 160 ml/ 100 l wody 0,5 - 0,8 l/ha	Przed kwitnieniem lub w przypadku niedoborów.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **11**% w/w (15% w/v)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ BORU W FORMIE EFEKTYWNEJ BOROETANOLOAMINY. PRZECIWDZIAŁA ZAMIERANIU STOŻKA WZROSTU I KORZENI WŁOŚNIKOWYCH. STYMULUJE KWITNIENIE I OGRANICZA OPADANIE OWOCÓW.



CALGREEN



WYSOKA ZAWARTOŚĆ MRÓWCZANU WAPNIA

SZYBKO PRZYSWAJALNA I DZIAŁAJĄCA FORMA WAPNIA	BUDUJE ELASTYCZNE I MOCNE ŚCIANY KOMÓRKOWE	POPRAWIA JAKOŚĆ PLONU I JEGO ZDOLNOŚCI PRZECHOWALNICZE

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
JABŁONIE, GRUSZE	1,5 – 2,5 kg/ha	Po kwitnieniu , w czasie wzrostu zawiązków owoców co 10-15 dni.
WIŚNIE, CZEREŚNIE, ŚLIWY	1,5 – 2 kg/ha	Po kwitnieniu, w czasie wzrostu zawiązków owoców co 8-10 dni (2-3 zabiegi).
JAGODNIKI (TRUSKAWKA, MALINA, BORÓWKA, PORZECZKA)	2 – 2,5 kg/ha	Od pierwszych zawiązków co 8-10 dni.
WARZYWA POD OSŁONAMI	250 – 350 g/100 l wody	2-3 zabiegi co 10-14 dni od momentu pojawienia się zawiązków lub przed i po zamknięciu główek oraz w przypadku stresu roślin.
POMIDORY, OGÓRKI, PAPRYKA, CUKINIA	1,5 – 2 kg/ha	2-3 zabiegi co 10-14 dni od momentu pojawienia się zawiązków owoców.
WARZYWA KAPUSTNE (KAPUSTA PEKIŃSKA, KAPUSTA GŁOWIASTA)	1,5 – 2 kg/ha	2-3 zabiegi przed i po zamknięciu główek oraz w przypadku stresu roślin.
WARZYWA KAPUSTNE (KALAFIOR, BROKUŁ)	1,5 – 2 kg/ha	2-3 zabiegi od początku tworzenia róży oraz w przypadku stresu roślin.
WARZYWA KORZENIOWE (MARCHEW, PIETRUSZKA SELER)	1,5 – 2 kg/ha	2-3 zabiegi od początku wzrostu korzenia co 14 dni.
ROLNICZE	1,25 – 1,5 kg/ha	30 dni po wschodach roślin lub po ruszeniu wegetacji, powtórzyć 1-2 razy co 30 dni.
ROŚLINY OZDOBNE	150 – 200 g/100 l wody 0,75 - 1,0 kg/ha	Przez cały cykl co 12-15 dni.
Kąpiele konserwujące owoce: 1,0 – 2,0 kg na 100 l wody.		

SKŁAD: (% w/w)

Wapń wyrażona jako rozpuszczalny w wodzie (CaO)..... 40% w/w
Mrówczan..... 64% w/w

SZYBKO, SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE DOSTARCZA WAPŃ DO OWOCÓW. ZAPOBIEGA CHOROBOM FIZJOLOGICZNYM SPOWODOWANYM NIEDOBOREM WAPNIA. POPRAWIA JĘDRNOŚĆ I ZAPOBIEGA PĘKANIU OWOCÓW.

Dostępne opakowania



CALBORON

ZAPOBIEGA WYSTĘPOWANIU CHORÓB FIZJOLOGICZNYCH SPOWODOWANYCH NIEDOBOREM WAPNIA
WYSOCE PRZYSWAJALNY WAPŃ

POPRAWIA JAKOŚĆ PLONU	INNOWACYJNA FORMA WAPNIA	SKUTECZNY W KAŻDYCH WARUNKACH

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE Dolistnie	TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
DRZEWA OWOCOWE	2,5-3,5 kg/ha	Co 10-14 dni od pojawienia się zawiązków owoców oraz w przypadku wystąpienia stresu roślin.
JAGODOWE		
WARZYWA POD OSŁONAMI	300-400 g/100 l wody	Co 14-20 dni od momentu pojawienia się zawiązków owoców lub przed i po zamknięciu główek oraz w przypadku stresu roślin.
WARZYWA POLOWE	2-3 kg/ha	
ROLNICZE	2-3 kg/ha	30 dni po wschodach roślin lub po ruszeniu wegetacji, powtórzyć 1-2 razy, co 30 dni.
ROŚLINY OZDOBNE	1,5-2,5 kg/ha	Co 15-20 dni oraz w przypadku wystąpienia stresu.

SKŁAD: (% w/w)

Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie..... 30% w/w
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie..... 1% w/w
pH: 7,0 ± 0,5

PRODUKT ZAWIERA INNOWACYJNA FORMĘ WAPNIA, KTÓRA W POŁĄCZENIU Z BOREM PRZEKŁADA SIĘ NA WYSOKĄ PRZYSWAJALNOŚĆ SKŁADNIKÓW. ZAPOBIEGA PRZED WYSTĄPIENIEM CHORÓB FIZJOLOGICZNYCH ORAZ ZWIĘKSZA ILOŚĆ PLONU HANDLOWEGO.



1 kg 5 kg

GREENMIX



ZAPOBIEGA I LIKWIDUJE NIEDOBORY MAGNEZU I MIKROELEMENTÓW

ZAPOBIEGA I LIKWIDUJE NIEDOBORY MIKROELEMENTÓW	PRZECIWDZIAŁA WYSTĘPOWANIU ZJAWISKA CHLOROZY	POPRAWIA ZDOLNOŚCI METABOLICZNE ROŚLIN

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKOWANIE	FAZY ZASTOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistne	
DRZEWA OWOCOWE	0,5 – 1 kg/ha	• Zapobiegawczo • Na początku wzrostu wegetatywnego • W przypadku niedoborów • W przypadku intensywnej produkcji • Po zbiorach
JAGODOWE	0,5 – 1 kg/ha	
WARZYWA W POLU	0,5 – 1 kg/ha	
WARZYWA POD OSŁONAMI	100-150 g /100l wody	
ROLNICZE	0,5 – 1 kg/ha	
ROŚLINY OZDOBNE	0,25 – 0,75 kg/ha	
FERTYGACJA: 0,5 – 1,5 kg/1000m^2.		
W PRZYPADKU ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z DOLISTNYMI NAWOZAMI WIELOSKŁADNIKOWYMI LUB NAWOZAMI ORGANICZNYMI ZALECA SIĘ UŻYCIE DOLNEJ DAWKI PRODUKTU - 0,5 kg/ha.		

SKŁAD: (% w/w)

Tlenek magnezu (**MgO**) rozpuszczalny w wodzie..... 9% w/w
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie..... 0,5% w/w
Miedź (**Cu**) schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie..... 1% w/w
Żelazo (**Fe**) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie..... 4% w/w
Mangan (**Mn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie..... 4% w/w
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie..... 0,1% w/w
Cynk (**Zn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie..... 2% w/w

Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

pH (w 1% roztworze wodnym) 3,5 ± 0,5 u. pH

SPECJALNIE DOBRANA KOMPOZYCJA MIKROELEMENTÓW WPŁYWAJĄCA KORZYSTNIE NA PRZEBIEG PODSTAWOWYCH PROCESÓW BIOCHEMICZNYCH W ROŚLINIE. WYSOKA ZAWARTOŚĆ ŻELAZA ZAPOBIEGA WYSTĘPOWANIU ZJAWISKA CHLOROZY. DOSKONAŁY DO ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z PRODUKTAMI ZAWIERAJĄCYMI MAKROELEMENTY W FORMIE PŁYNNEJ LUB KRYSTALICZNEJ.

Dostępne opakowania

35 LAT TRADYCJI W NAWOŻENIU

NAWOZY MINERALNE KRYSTALICZNE

Linia nawozów **MINERALNYCH KRYSTALICZNYCH** rozpuszczalnych w wodzie. Charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością we wszystkich rodzajach wody, gdyż wyprodukowane są z surowców najwyższej jakości. Szeroka gama składów proponowanych w produktach Greenplant, Kinglife i Calfon pozwala na stworzenie pełnych zaleceń nawożenia dolistnego jak i poprzez fertygację. Nawozy te cechują się wysoką przyswajalnością zarówno zastosowane dolistnie jak i poprzez systemy nawadniające.

GREENPLANT Line

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE O SZYBKIM DZIAŁANIU

POSIADAJĄ ZRÓŻNICOWANY SKŁAD Z MIKROELEMENTAMI

SZYBKO I EFEKTYWNIE DASTARCZAJĄ DUŻE ILOŚCI NPK Z MIKROELEMENTAMI

IDEALNE DO ZASTOSOWANIA ZARÓWNO DOLISTNIE JAK I PRZEZ FERTYGACJĘ

SKŁAD

GREENPLANT	SKŁAD % w/w										
	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) amidowy	P_2O_5	K_2O	MgO	B	Fe EDTA	Mn	Mo	Zn
6-21-36+3+micro	6	-	-	21	36	3	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
10-50-10+micro	1,2	8,8	-	50	10	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-9-34+2+mcro	10	2	-	9	34	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
8-7-40+2+micro	7	1	-	7	40	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-36-12+2+micro	3,5	8,5	-	36	12	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
20-20-20+micro	4,4	3	12,6	20	20	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002

SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCY MAKRO I MIKROELEMENTY ODPOWIEDNIO DOBRANE DO FAZ ROZWOJU ROŚLIN. WYSOKA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW WPŁYWA NA DOSKONAŁĄ ROZPUSZCZALNOŚĆ, IDEALNE DO FERTYGACJI.

Dostępne opakowania

GREEN ECO POLAND

KINGLIFE Line

NAWOZY KRYSTALICZNE ZAWIERAJĄCE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MAKRO I MIKROELEMENTY

ZAWIERAJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MAKRO I MIKROELEMENTY W FORMULE EDTA

IDEALNE DO STOSOWANIA WE WSZYSTKICH FAZACH ROZWOJU ROŚLIN

SZYBKO I EFEKTYWNIE DASTARCZAJĄ DUŻE ILOŚCI NPK I MIKROELEMENTÓW

SKŁAD

KINGLIFE	SKŁAD % w/w											
	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) amidowy	P_2O_5	K_2O	MgO	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
30-10-10+micro	3,8	3,7	22,5	10	10	-	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
20-20-20+micro	6,0	5,1	8,9	20	20	-	0,02	0,05	0,1	0,05	0,001	0,05
12-48-8+micro	2,0	10,0	-	48	8	-	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
3-5-40+3+micro	3,0	-	-	5	40	3	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01

PEŁNA PALETA NAWOZÓW ZAWIERAJĄCYCH MAKRO I MIKROELEMENTY DOPASOWANA DO OKREŚLONYCH FAZ FENOLOGICZNYCH ROŚLIN. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW UŻYTYCH DO PRODUKCJI PRZEKŁADA SIĘ NA DOSKONAŁĄ ROZPUSZCZALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA.

CALFON

pH 3

UNIKALNA KOMPOZYCJA NPK, MIKRO I WAPNIA, POZWALAJĄCA DOSTARCZYĆ WSZYSTKIE TE SKŁADNIKI W JEDNYM ZABIEGU

DOSTARCZA AZOT, FOSFOR, POTAS I WAPŃ ORAZ MIKROELEMENTY

ZWIĘKSZA ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

WPŁYWA NA WYSOKĄ JĘDRNOŚĆ OWOCÓW

DAWKOWANIE

UPRAWY	DAWKA		TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
	Dolistnie	Fertygacja	
DRZEWA OWOCOWE	300-500 g/100 l wody	15 – 30 kg/ha	Od wytworzenia zawiązków do zbioru owoców, a w przypadku przemrożeń zimowych od początku wegetacji.
JAGODOWE	250-450 g/100 l wody	15-30 kg/ha	
WARZYWA POLOWE	250-450 g/100 l wody	15 - 25 kg/ha	Podczas wzrostu wegetatywnego lub od wytworzenia zawiązków do zbiorów.
WARZYWA POD OSŁONAMI	150-350 g/100 l wody	2,5 kg /1000 m^2	
ROLNICZE	300-500 g/100 l wody	-	Podczas wzrostu wegetatywnego.
ROŚLINY OZDOBNE	150-250 g/100 l wody	2,5 kg/1000 m^2	Podczas wzrostu wegetatywnego.
HYDROPONIKA I UPRAWY BEZGLEBOWE: UŻYWAĆ PRODUKT DO PRZYGOTOWANIA ROZTWORU BAZOWEGO PRZY MAKSYMALNYM STĘŻENIU 15-20% I ROZPROWADZIĆ W WODZIE NAWADNIAJĄCEJ W PROPORCJI PRZEWIDZIANEJ DLA DANEJ UPRAWY.			
W FERTYGACJI: zaleca się działać przy stężeniu 0,2% w uprawach kwiatowych oraz 0,2-0,3% w uprawach warzyw i owoców. Na terenach piaszczystych zaleca się dzielić dawki na kilka zabiegów.			

SKŁAD: (% w/w)

Azot (**N**) całkowity ..... **14**% w/w
Azot (N) azotanowy ..... 10% w/w
Azot (N) amidowy ..... 4% w/w
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie ..... **11** % w/w
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie ..... **22**% w/w
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie ..... **8**% w/w
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,01**% w/w
Żelazo (**Fe**) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie ..... **0,02**% w/w
Mangan (**Mn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie ..... **0,01**% w/w
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie ..... **0,001**% w/w
Cynk (**Zn**) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie..... **0,002**% w/w

Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

pH (w 1% roztworze wodnym) 3,0 ± 0,5 u. pH

KOMPLETNE, UNIKALNE POŁĄCZENIE MAKRO I MIKROELEMENTÓW ORAZ DUŻEJ ZAWARTOŚCI WAPNIA. PRODUKT O NISKIM pH POZWALAJĄCY NA SKUTECZNE DOSTARCZENIE FOSFORU I WAPNIA BEZ RYZYKA WYTRĄCEŃ. DOSKONAŁY DO FERTYGACJI, SKUTECZNIE OCZYSZCZA LINIE KROPLUJĄCE.

Dostępne opakowania

10 kg 25 kg

GREEN ECO POLAND

KONDYCJONERY I AKTYWATORY

Linia produktów **KONDYCJONERY i AKTYWATORY** zawiera nawozy wielofunkcyjne, które regulują pH wody oraz aktywują i poprawiają skuteczność zabiegów agrochemicznych.

VYRER



WIELOFUNKCYJNY KONDYCJONER WODY

AKTYWUJE DZIAŁANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW	REGULUJE pH WODY	ADIUWANT ANTYPIENIACZ NAWÓZ

DAWKOWANIE

SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DAWKI:
VYRER dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.
Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się uzyskać.
Zaleca się rozpocząć od ilości **50 ml/100 l wody,** stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.
Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia.
Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji **0,15 – 0,2%.**

LIŚCIE RZEPAKU PRZED I PO ZASTOSOWANIU VYRER

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)

Azot (N) całkowity ..... 3% w/w (3,45% w/v)
Azot (N) amidowy..... 3% w/w (3,45% w/v)
Tlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie..... 18% w/w (20,7% w/v)

pH (w 1% roztworze wodnym) 2,0 ± 0,5 u. pH



ZAPOBIEGA HYDROLIZIE ZASADOWEJ SUBSTANCJI AKTYWNEJ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. ZMNIEJSZA RYZYKO WYTRĄCEŃ STOSOWANYCH ŁĄCZNIE AGROCHEMIKALIÓW JEDNOCZEŚNIE POPRAWIAJĄC ICH SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA. DZIĘKI SKALI KOLORYMETRYCZNEJ POZWALA SZYBKO OKREŚLIĆ POŻĄDANE pH WODY.

Dostępne opakowania



GREEN ECO POLAND

TABELA MIESZALNOŚCI



EXPANDO ZAWIERA ODPOWIEDNIE PROPORCJE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I BIOSTYMULUJĄCYCH.
NIE WYMAGA DODATKU ŻADNYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH MIKRO I MAKROELEMENTY.

- MOŻNA MIESZAĆ
- MOŻNA MIESZAĆ WARUNKOWO LUB UPRZEDNIO PRZEPROWADZAJĄC TEST MIESZALNOŚCI
- NIE MOŻNA MIESZAĆ

NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE PREPARATÓW MOŻE SPOWODOWAĆ WYSTĄPIENIE FITOTOKSYCZNOŚCI NA ROŚLINACH.

SPIS PRODUKÓW

PREMIUM	DOLISTNIE	FERTYGACJA	STOP & GO	STRONA
EXPANDO	✓		GO	8
REVIVAL	✓		GO	10
ALGAREN BZN	✓	✓	STOP	11
ALGAREN TWIN	✓	✓	STOP	12
MINERAŁY PREMIUM				
KRIPTHER	✓	✓	NEUTRAL	16
MAGIC P STAR	✓	✓	STOP	17
CALFOMYTH	✓	✓	STOP	18
HASCON M 10 AD	✓	✓	STOP	19
NAWOZY ORGANICZNE				
GREENHUM	✓	✓	GO	22
GREENHUM WP	✓	✓	GO	23
VIT-ORG	✓	✓	GO	24
GREIT VG	✓	✓	GO	25
NUTRIGREEN AD	✓	✓	GO	26
MAKRO I MIKROELEMENTY				
CARRIER Zn	✓		NEUTRAL	30
BOROGREEN L	✓	✓	NEUTRAL	31
CALGREEN	✓	✓	NEUTRAL	32
CALBORON	✓	✓	NEUTRAL	33
GREENMIX	✓	✓	NEUTRAL	34
NAWOZY MINERALNE KRYSTALICZNE				
GREENPLANT LINE	✓	✓	GO/STOP	38
KINGLIFE LINE	✓	✓	GO/STOP	39
CALFON	✓	✓	NEUTRAL	40
KONDYCJONERY I AKTYWATORY				
VYRER	✓		NEUTRAL	44

PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY DOLISTNIE

PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY W FERTYGACJI

GREEN ECO POLAND

NOTATKI

NOTATKI

GREEN
ECO
POLAND