



GREEN
ECO POLAND

PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO I FERTYGACJI



TRUSKAWKA

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. NAWOŻENIA I FERTYGACJI:



Zbigniew: 606 783 059
Specjalizacja: Sadownictwo




Sebastian: 728 144 115
Specjalizacja: Sadownictwo



Michał: 728 650 507
Specjalizacja: Uprawy jagodowe



Marcin: 538 311 090
Specjalizacja: Programy fertygacyjne



INNOWACJE

Zdrowy korzeń w zdrowej glebie

VIVEMA SOIL

Spokój, gdy pogoda szaleje

ERANTHIS

Naturalne wybarwianie owoców

SOLVERO

DOKARMIANIE DOLISTNE



1

Po ruszeniu
wegetacji




2

Przed
kwitnieniem



3

Początek
kwitnienia




4

Koniec
kwitnienia



5

Wzrost
zawiązków



6

Dojrzwanie
i zbiór



7

Koszenie
po zbiorach



8

Wzrost
po koszeniu




9

Tworzenie
pąków



10

Koniec
wegetacji



! Kolejność wlewania produktów do mieszanki zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu. Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

PROGRAM STOSOWANIA PRODUKTÓW MIEDZIOWYCH - DOLISTNIE



**MIEDŹ 380
PŁYNNĄ**
1,5 l/ha

FERTICUS ZEO
1 kg/ha

FERTICUS ZEO
1 kg/ha

lub

**MIEDŹ
MAX 700**
0,8 - 1 l/ha

ABIES CU
0,75 kg/ha

EXPANDO

PO OWOCACH GO POZNACIE

1

Dorodne, wyrównane,
idealnie wybarwione
owoce

2

Wysoki udział plonu
handlowego

3

Duży zwrot
z inwestycji



TABELA MIESZALNOŚCI

ALGAREN TWIN

SOLVERO

ERANTHIS

EXPANDO

VIVEMA SOIL

GREIT VG

NUTRIGREEN AD

VIT-ORG VG

CALFOMYTH

HASCON M10

MAGIC P

MOLYSTAR

CALFON LINE

GREENPLANT/KINGLIFE LINE

BOROGREEN L

CALGREEN

CARRIER Zn

FISIOCAL

GREENMIX

HASCON 32

WE CaN

HASCON S57

YVRER PLUS

LEGENDA:

- MOŻNA MIESZAĆ
- ▲ MOŻNA MIESZAĆ WARUNKOWO LUB UPRZEDNIO PRZEPROWADZAJĄC TEST MIESZALNOŚCI
- NIE MOŻNA MIESZAĆ

UWAGA!
NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE PREPARATÓW MOŻE SPOWODOWAĆ WYSTĄPIENIE FITOTOKSYCZNOŚCI NA ROŚLINACH.

VYRER PLUS

ZADBAJ O WŁAŚCIWE pH
CIECZY ROBOCZEJ

XYRER PLUS dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.

Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się uzyskać.

Zaleca się rozpocząć od ilości 50 ml/100 l wody, stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.

Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia. Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15 – 0,2%.

